

Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: PERAL

## de Agua Tardia

**Tamaño:** Pequeño.

**Forma:** Piriforme o turbinada. Cuello muy ligero, casi imperceptible. Asimétrica. Contorno con tendencia a pentagonal.

**Cavidad del pedúnculo:** Nula. **Pedúnculo:** Largo. Fino, ligeramente engrosado en los extremos. Color verde claro o parcialmente ruginoso cobrizo. Ligeramente curvo. Implantado oblicuo.

**Cavidad del ojo:** Ancha, muy profunda, ondulada, no sólo el borde, sino también la misma cavidad. **Ojo:** Mediano, pentagonal. Abierto o entreabierto. Sépalos tomentosos, triangulares, muy anchos, levantados y con frecuencia algo convergentes, con las puntas dobladas hacia afuera.

**Piel:** Lisa, brillante, untuosa. **Color:** Amarillo verdoso con chapa barreada rojo carmín, cubriendo aproximadamente un tercio del fruto. Punteado muy abundante, grande, ruginoso o amarillento con aureola verdosa sobre el fondo o carmín poco perceptible sobre la chapa.

**Tubo del cáliz:** En embudo con conducto muy ancho, a veces corto, otras largo y ensanchándose hacia el corazón y en algún caso comunicándose con éste.

**Corazón:** Grande. Eje abierto, anchísimo, comunicado en parte con las celdillas y a veces también con el tubo del cáliz, en este último caso los pistilos quedan en parte desprendidos de la pared del eje. Celdillas amplias, anchas y cortas.

**Semillas:** Tamaño medio. Elípticas, semiglobosas. Ligeramente espolonadas. Color castaño rojizo claro.

**Carne:** Blanca. Firme, crujiente, muy acuosa. **Sabor:** Extraordinariamente dulce pero sin aroma. Refrescante. Buena.

**Maduración:** Primera decena de agosto (Soller, Baleares).

